

GRUŻLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGIChP, Warszawa 2010
b od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	.	.	.	.

^aod 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269 ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587 ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616 ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGIChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	520
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2001	10672	10183	489	27,6	26,4	1,3
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
Śląskie						
2001	1456	1411	45	30,1	29,2	0,9
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2001	2758	2564	1456	1411	646
2002	2934	2732	1479	1321	690
2003	2692	2476	1283	1164	637
2004	2849	2611	1320	1220	632
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2000	56,9	52,9	35,4	34,3	16,4
2001	57,1	53,1	30,1	29,2	13,3
2002	62,0	57,7	31,2	27,9	14,6
2003	57,1	52,5	27,2	24,6	13,5
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania Mz - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	.	.	.	.

a Łącznie z PKP, MON i MSW b bez PKP, MON i MSW. Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2014 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2014	526	-	-	1	3	25	71	123	303
Mężczyźni	413	-	-	-	3	18	61	106	225
Kobiety	113	-	-	1	-	7	10	17	78
Miasta	323	-	-	1	3	15	48	81	175
Wieś	203	-	-	-	-	10	23	42	128
Śląskie ogółem 2014	102	-	-	1	-	5	17	33	46
Mężczyźni	90	-	-	-	-	4	16	30	40
Kobiety	12	-	-	1	-	1	1	3	6
Miasta	87	-	-	1	-	4	16	31	35
Wieś	15	-	-	-	-	1	1	2	11
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2014	1,4	-	-	0,0	0,1	0,4	1,4	2,2	3,6
Mężczyźni	2,2	-	-		0,1	0,6	2,5	4,0	6,5
Kobiety	0,6	-	-	0,1	-	0,2	0,4	0,6	1,6
Miasta	1,4	-	-	0,1	0,1	0,4	1,7	2,4	3,2
Wieś	1,3	-	-	-	-	0,4	1,1	2,0	4,3
Śląskie ogółem 2014	2,2	-	-	0,4	-	0,7	2,8	4,8	4,4
Mężczyźni	4,1	-	-	-	-	1,1	5,3	9,0	9,1
Kobiety	0,5	-	-	0,9	-	0,3	0,3	0,8	1,0
Miasta	2,4	-	-	0,6	-	0,7	3,5	5,7	4,2
Wieś	1,4	-	-	-	-	0,6	0,7	1,3	5,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

^aod 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio- roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2006	33	1316	1295	25247	344993	262,2	71,8	13,7	19,2
2007	33	1274	1273	26387	336858	264,4	72,4	12,8	20,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	8	374	374	7021	97160	259,8	71,2	13,8	18,8
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	2556	18072	105,7	29,0	7,1	14,9
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	18	591	591	18419	141150	238,8	65,4	7,7	31,2

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, OAiSM - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci	z tego		Gruźlica wszystkich postaci	z tego	
		gruźlica płuc	gruźlica pozapłucna		gruźlica płuc	gruźlica pozapłucna
	liczby bezwzględne			współczynniki na 100 tys. ludności		
Śląskie 2015	1163	1112	51	25,4	24,3	1,1
Powiaty						
będziński	86	83	3	57,2	55,2	2,0
bielski	85	79	6	52,6	48,8	3,7
bieruńsko-lędziński	.	.	.	.	.	.
cieszyński	19	18	1	10,7	10,1	0,6
częstochowski	.	.	.	.	.	.
gliwicki	155	152	3	134,6	132,0	2,6
kłobucki	.	.	.	.	.	.
lubliniecki	46	43	3	59,8	55,9	3,9
mikołowski	85	85	0	88,3	88,3	0,0
myszkowski	3	3	0	4,2	4,2	0,0
pszczyński	7	6	1	6,4	5,5	0,9
raciborski	11	10	1	10,1	9,2	0,9
rybnicki	.	.	.	.	.	.
tarnogórski	19	17	2	13,7	12,3	1,4
wodzisławski	97	93	4	61,4	58,9	2,5
zawierciański	4	4	0	3,3	3,3	0,0
żywiecki	4	4	0	2,6	2,6	0,0
Miasta na prawach powiatu						
Bielsko-Biała	3	3	0	1,7	1,7	0,0
Bytom	43	42	1	25,1	24,5	0,6
Chorzów	143	141	2	129,9	128,0	1,8
Częstochowa	125	115	10	54,6	50,2	4,4
Dąbrowa Górnicza	22	20	2	17,9	16,3	1,6
Gliwice	41	40	1	22,3	21,7	0,5
Jastrzębie Zdrój	1	1	0	1,1	1,1	0,0
Jaworzno	5	5	0	5,4	5,4	0,0
Katowice	60	55	5	19,9	18,3	1,7
Mysłowice	2	2	0	2,7	2,7	0,0
Piekary Śląskie	1	1	0	1,8	1,8	0,0
Ruda Śląska	7	7	0	5,0	5,0	0,0
Rybnik	3	3	0	2,1	2,1	0,0
Siemianowice Śląskie	2	2	0	2,9	2,9	0,0
Sosnowiec	47	45	2	22,6	21,6	1,0
Świętochłowice	1	1	0	1,9	1,9	0,0
Tychy	2	2	0	1,6	1,6	0,0
Zabrze	33	29	4	18,7	16,4	2,3
Żory	1	1	0	1,6	1,6	0,0

^a w tym zachorowania bez możliwości umiejscowienia terytorialnego w skali województwa – 37-gruźlica wszystkich postaci, 31-gruźlica płuc, 6- gruźlica pozapłucna

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczby bezwzględne	współczynniki	liczby bezwzględne	współczynniki	liczby bezwzględne	współczynniki
Ogółem	1124	24.6	798	36.2	326	13.8
Powiaty						
będziński	62	41.3	38	53.1	24	30.6
bielski	31	19.1	19	24.0	12	14.5
bieruńsko-lędziński	10	17.0	6	20.6	4	13.4
cieszyński	37	20.8	24	27.8	13	14.2
częstochowski	33	24.3	25	37.6	8	11.6
gliwicki	52	45.1	43	77.1	9	15.2
kłobucki	21	24.6	17	40.4	4	9.3
lubliniecki	29	37.7	23	60.7	6	15.4
mikołowski	28	29.0	20	42.6	8	16.2
myszkowski	10	13.9	6	17.3	4	10.8
pszczyński	16	14.6	14	26.0	2	3.6
raciborski	11	10.1	7	13.3	4	7.1
rybnicki	16	20.7	16	41.9	0	0,0
tarnogórski	23	16.6	17	25.2	6	8,4
wodzisławski	38	24.1	24	31.2	14	17.3
zawierciański	18	15.0	17	29.2	1	1.6
żywiecki	28	18.3	23	30.8	5	6.4
Miasta na prawach powiatu						
Bielsko - Biała	22	12.7	17	20.9	5	5.5
Bytom	63	36.9	45	55.1	18	20.2
Chorzów	52	47.4	37	70.8	15	26.1
Częstochowa	64	28.0	44	41.0	20	16.5
Dąbrowa Górnicza	37	30.2	24	40.7	13	20.4
Gliwice	63	34.4	35	39.7	28	29.4
Jastrzębie Zdrój	21	23.3	17	38.5	4	8.7
Jaworzno	12	12.9	9	20.0	3	6.3
Katowice	58	19.3	41	28.8	17	10.8
Mysłowice	18	24.0	11	30.4	7	18.1
Piekary Śląskie	27	47.9	19	70.4	8	27.2
Ruda Śląska	47	33.6	32	47.3	15	20.8
Rybnik	24	17.2	18	26.4	6	8.4
Siemianowice Śl.	14	20.5	9	27.6	5	14.0
Sosnowiec	33	15.9	26	26.5	7	6.4
Świętochłowice	16	31.4	12	49.0	4	15.1
Tychy	16	12.5	8	12.9	8	12.0
Zabrze	66	37.4	49	57.6	17	18.6
Żory	8	12.9	6	19.8	2	6.3

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl. UW

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Polska	7250	6698	6430	18,8	17,4	16,7
1. Dolnośląskie	659	547	484	22,6	18,8	16,7
2. Kujawsko - pomorskie	348	287	297	16,6	13,7	14,2
3. Lubelskie	591	570	486	27,4	26,5	22,7
4. Lubuskie	209	143	115	20,4	14,0	11,3
5. Łódzkie	574	572	554	22,8	22,8	22,2
6. Małopolskie	560	538	555	16,7	16,0	16,5
7. Mazowieckie	1175	973	794	22,1	18,3	14,9
8. Opolskie	167	132	165	16,6	13,2	16,5
9. Podkarpackie	279	336	348	13,1	15,8	16,4
10. Podlaskie	150	134	125	12,5	11,2	10,5
11. Pomorskie	356	330	361	15,5	14,4	15,7
12. Śląskie	1100	1154	1213	23,9	25,1	26,5
13. Świętokrzyskie	309	296	277	24,3	23,4	22,0
14. Warmińsko-mazurskie	192	166	132	13,3	11,5	9,2
15. Wielkopolskie	343	321	289	9,9	9,3	8,3
16. Zachodniopomorskie	238	199	235	13,8	11,6	13,7

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2015 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2015	6430	81	83	1752	2909	1605	16,7	1,4	4,1	12,2	28,1	26,9
1. Dolnośląskie	484	2	7	138	240	97	16,7	0,5	5,0	12,6	29,7	21,1
2. Kujawsko - pomorskie	297	9	7	82	126	73	14,2	2,9	6,1	10,5	22,2	23,3
3. Lubelskie	486	5	3	130	184	164	22,7	1,6	2,5	16,4	32,3	47,5
4. Lubuskie	115	-	4	35	51	25	11,3	-	7,4	9,1	18,2	17,0
5. Łódzkie	554	2	7	151	256	138	22,2	0,6	5,7	16,8	36,8	31,8
6. Małopolskie	555	2	4	146	219	184	16,5	0,4	2,1	11,4	25,4	36,3
7. Mazowieckie	794	34	20	220	323	197	14,9	4,1	7,6	11,0	23,4	23,0
8. Opolskie	165	-	-	32	89	44	16,5	-	-	8,7	31,1	27,3
9. Podkarpackie	348	1	5	95	142	105	16,4	0,3	4,0	11,7	25,7	33,7
10. Podlaskie	125	2	1	39	52	31	10,5	1,2	1,5	8,8	16,2	16,4
11. Pomorskie	361	2	6	103	178	72	15,7	0,5	4,8	11,8	29,6	21,7
12. Śląskie	1213	6	11	350	619	227	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
13. Świętokrzyskie	277	11	3	59	116	88	22,0	6,3	4,4	12,9	33,4	41,4
14. Warmińsko-mazurskie	132	1	1	28	65	37	9,2	0,4	1,2	5,1	16,4	18,7
15. Wielkopolskie	289	1	4	86	146	52	8,3	0,2	2,1	6,5	16,2	10,4
16. Zachodniopomorskie	235	3	-	58	103	71	13,7	1,2	-	9,1	21,3	27,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Polska	6835	6311	6078	17,8	16,4	15,8
1. Dolnośląskie	618	506	458	21,2	17,4	15,8
2. Kujawsko - pomorskie	326	270	279	15,6	12,9	13,4
3. Lubelskie	551	535	457	25,5	24,9	21,3
4. Lubuskie	201	136	112	19,7	13,3	11,0
5. Łódzkie	555	546	537	22,0	21,8	21,5
6. Małopolskie	534	502	524	15,9	14,9	15,5
7. Mazowieckie	1100	926	724	20,7	17,4	13,6
8. Opolskie	162	122	155	16,1	12,2	15,5
9. Podkarpackie	263	317	327	12,4	14,9	15,4
10. Podlaskie	145	127	117	12,1	10,6	9,8
11. Pomorskie	334	313	330	14,6	13,6	14,3
12. Śląskie	1011	1088	1159	21,9	23,7	25,3
13. Świętokrzyskie	298	279	265	23,5	22,0	21,0
14. Warmińsko-mazurskie	180	154	128	12,4	10,7	8,9
15. Wielkopolskie	327	295	278	9,4	8,5	8,0
16. Zachodniopomorskie	230	195	228	13,4	11,4	13,3

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2015 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2015	6078	51	70	1650	2812	1495	15,8	0,9	3,5	11,5	27,2	25,0
1. Dolnośląskie	458	2	7	130	227	92	15,8	0,5	5,0	11,9	28,1	20,0
2. Kujawsko - pomorskie	279	5	6	78	122	68	13,4	1,6	5,3	10,0	21,5	21,7
3. Lubelskie	457	3	2	125	175	152	21,3	0,9	1,7	15,8	30,7	44,1
4. Lubuskie	112	-	4	35	50	23	11,0	-	7,4	9,1	17,8	15,7
5. Łódzkie	537	1	6	145	251	134	21,5	0,3	4,9	16,2	36,1	30,9
6. Małopolskie	524	1	4	137	211	171	15,5	0,2	2,1	10,7	24,5	33,7
7. Mazowieckie	724	17	15	198	313	181	13,6	2,0	5,7	9,9	22,6	21,2
8. Opolskie	155	-	-	27	87	41	15,5	-	-	7,3	30,4	25,4
9. Podkarpackie	327	-	5	89	134	99	15,4	-	4,0	10,9	24,3	31,7
10. Podlaskie	117	2	1	35	50	29	9,8	1,2	1,5	7,9	15,6	15,3
11. Pomorskie	330	1	5	95	169	60	14,3	0,3	4,0	10,9	28,1	18,1
12. Śląskie	1159	6	10	330	602	211	25,3	0,9	4,6	19,8	46,4	28,2
13. Świętokrzyskie	265	10	2	57	112	84	21,0	5,7	3,0	12,5	32,2	39,5
14. Warmińsko-mazurskie	128	1	1	27	63	36	8,9	0,4	1,2	5,0	15,9	18,2
15. Wielkopolskie	278	1	2	85	144	46	8,0	0,2	1,1	6,4	15,9	9,2
16. Zachodniopomorskie	228	1	-	57	102	68	13,3	0,4	-	8,9	21,1	26,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Polska	630	532	526	1,6	1,4	1,4
1. Dolnośląskie	55	42	40	1,9	1,4	1,4
2. Kujawsko - pomorskie	22	17	11	1,0	0,8	0,5
3. Lubelskie	31	34	40	1,4	1,6	1,9
4. Lubuskie	26	12	6	2,5	1,2	0,6
5. Łódzkie	37	59	39	1,5	2,3	1,6
6. Małopolskie	53	51	55	1,6	1,5	1,6
7. Mazowieckie	94	65	62	1,8	1,2	1,2
8. Opolskie	14	13	10	1,4	1,3	1,0
9. Podkarpackie	30	14	28	1,4	0,7	1,3
10. Podlaskie	9	14	10	0,8	1,2	0,8
11. Pomorskie	26	31	26	1,1	1,4	1,1
12. Śląskie	134	99	102	2,9	2,1	2,2
13. Świętokrzyskie	22	15	20	1,7	1,2	1,6
14. Warmińsko-mazurskie	25	24	32	1,7	1,7	2,2
15. Wielkopolskie	24	21	25	0,7	0,6	0,7
16. Zachodniopomorskie	28	21	20	1,6	1,2	1,2

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2003	93,5	93,7
2004	94,1	93,7
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)		
	2013	2014	2015
Polska	92,5	92,4	93,8
1. Dolnośląskie	94,1	92,0	96,3
2. Kujawsko - pomorskie	93,3	92,6	94,0
3. Lubelskie	90,0	89,6	90,5
4. Lubuskie	92,1	93,9	93,3
5. Łódzkie	91,7	92,0	92,8
6. Małopolskie	92,0	92,8	92,4
7. Mazowieckie	94,2	93,6	95,5
8. Opolskie	92,0	91,3	92,6
9. Podkarpackie	90,0	89,9	92,7
10. Podlaskie	91,2	92,3	92,8
11. Pomorskie	94,4	95,0	93,4
12. Śląskie	93,0	92,5	94,3
13. Świętokrzyskie	89,5	89,0	91,5
14. Warmińsko-mazurskie	90,8	90,4	92,7
15. Wielkopolskie	92,9	93,5	94,4
16. Zachodniopomorskie	91,0	92,4	94,0

* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2013, 2014, 2015 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób oraz obliczeń własnych.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2012		2013		2014	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	646	7,7	649	7,7	582	6,8
2	Belgium	1313	12,8	976	8,8	963	8,6	959	8,6
3	Bulgaria	.	.	2280	31,1	1932	26,5	1872	25,8
4	Croatia	.	.	570	13,3	522	12,2	497	11,7
5	Cyprus	33	4,2	69	8,0	41	4,7	41	4,8
6	Czech Republic	1442	14,0	597	5,7	497	4,7	514	4,9
7	Denmark	548	10,3	389	7,0	356	6,4	320	5,7
8	Estonia	791	57,9	289	21,8	287	21,7	246	18,7
9	Finland	537	10,4	274	5,1	273	5,0	259	4,8
10	France	6714	11,0	4978	7,6	4939	7,5	4845	7,4
11	Germany	9064	11,0	4210	5,1	4319	5,3	4488	5,6
12	Greece	703	6,4	558	5,0	540	4,9	519	4,7
13	Hungary	3598	35,9	1223	12,3	1045	10,5	851	8,6
14	Iceland	.	.	11	3,4	11	3,4	8	2,5
15	Ireland	403	10,6	359	7,8	376	8,2	316	6,9
16	Italy	4759	8,3	3142	5,3	3153	5,3	-	-
17	Latvia	2063	87,0	993	48,6	904	44,7	761	38,0
18	Lithuania	2981	85,2	1781	59,3	1705	57,4	1607	54,6
19	Luxembourg	44	10,1	45	8,6	38	7,1	24	4,4
20	Malta	18	4,6	42	10,1	50	11,9	46	10,8
21	Netherlands	1404	8,8	956	5,7	844	5,0	823	4,9
22	Norway	.	.	374	7,5	401	7,9	325	6,4
23	Poland	11477	29,7	7542	19,8	7250	19,0	6698	17,6
24	Portugal	4494	44,9	2606	24,7	2403	22,9	2226	21,3
25	Romania	.	.	18190	90,5	16692	83,4	15906	79,7
26	Slovakia	1111	20,6	345	6,4	401	7,4	336	6,2
27	Slovenia	380	19,1	138	6,7	140	6,8	144	7,0
28	Spain	8395	20,6	6070	13,0	5588	12,0	5048	10,9
29	Sweden	458	5,2	623	6,6	639	6,7	670	6,9
30	United Kingdom	6792	11,5	8714	13,7	7863	12,3	7077	11,0
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	68990	13,5	64821	12,7	58008	12,8

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2012-2014: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2016.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2014 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	4	0,7	10	1,8	96	17,0	185	32,8	150	26,6	119	21,1	0	0,0	564
2	Belgium	32	3,6	29	3,3	126	14,2	377	42,6	185	20,9	137	15,5	0	0,0	886
3	Bulgaria	48	2,6	97	5,3	122	6,7	572	31,3	629	34,5	357	19,6	0	0,0	1825
4	Croatia	1	0,2	2	0,4	30	6,0	109	22,0	178	35,9	176	35,5	0	0,0	496
5	Cyprus	0	0,0	0	0,0	7	17,9	23	59,0	5	12,8	4	10,3	0	0,0	39
6	Czech Republic	3	0,6	2	0,4	20	4,2	129	27,2	177	37,3	143	30,2	0	0,0	474
7	Denmark	5	1,7	4	1,4	30	10,2	124	42,3	101	34,5	29	9,9	0	0,0	293
8	Estonia	0	0,0	1	0,4	9	3,8	88	37,3	103	43,6	35	14,8	0	0,0	236
9	Finland	4	1,6	4	1,6	21	8,3	61	24,2	47	18,7	115	45,6	0	0,0	252
10	France	134	3,0	137	3,0	590	13,0	1729	38,1	1035	22,8	910	20,1	0	0,0	4535
11	Germany	61	1,4	85	2,0	710	16,4	1379	31,9	1071	24,7	1020	23,6	2	0,0	4328
12	Greece	6	1,2	3	0,6	42	8,7	175	36,2	110	22,7	145	30,0	3	0,6	484
13	Hungary	0	0,0	4	0,5	47	5,9	187	23,4	361	45,2	200	25,0	0	0,0	799
14	Iceland	0	0,0	0	0,0	3	37,5	3	37,5	2	25,0	0	0,0	0	0,0	8
15	Ireland	0	0,0	7	2,4	30	10,1	121	40,7	76	25,6	63	21,2	0	0,0	297


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2014 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
16	Latvia	17	2,3	24	3,3	61	8,3	309	41,9	267	36,2	60	8,1	0	0,0	738
17	Lithuania	3	0,2	19	1,3	89	6,0	511	34,5	608	41,1	251	16,9	0	0,0	1481
18	Luxembourg	0	0,0	0	0,0	3	12,5	14	58,3	2	8,3	5	20,8	0	0,0	24
19	Malta	0	0,0	0	0,0	20	44,4	19	42,2	3	6,7	3	6,7	0	0,0	45
20	Netherlands	14	1,7	34	4,2	119	14,6	326	40,0	195	24,0	126	15,5	0	0,0	814
21	Norway	2	0,7	11	3,6	67	22,1	173	57,1	34	11,2	16	5,3	0	0,0	303
22	Poland	26	0,4	44	0,7	269	4,1	1563	23,9	2914	44,6	1723	26,3	0	0,0	6539
23	Portugal	18	0,8	25	1,2	183	8,4	743	34,3	711	32,8	488	22,5	1	0,0	2169
24	Romania	219	1,5	420	2,8	1931	13,0	5150	34,7	4949	33,3	2192	14,8	0	0,0	14861
25	Slovakia	32	10,0	12	3,8	23	7,2	70	21,9	107	33,4	76	23,8	0	0,0	320
26	Slovenia	2	1,4	1	0,7	2	1,4	33	23,2	40	28,2	64	45,1	0	0,0	142
27	Spain	148	3,1	149	3,1	454	9,4	1759	36,5	1304	27,1	1002	20,8	2	0,0	4818
28	Sweden	6	0,9	47	7,4	141	22,2	290	45,7	91	14,3	60	9,4	0	0,0	635
29	United Kingdom	93	1,4	181	2,7	828	12,5	2961	44,7	1553	23,5	1006	15,2	0	0,0	6622
Subtotal EU/EAA		878	1,6	1352	2,5	6073	11,0	19183	34,9	17008	30,9	10525	19,1	8	0,0	55027


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2016", European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm 2016

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM-
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI






ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2015 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI.





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2014 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC (4270-4273)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

