

GRUŻLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3
2017	15,1	20,9
2018	14,3	18,6

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. Ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3
2017	5787	15,1	952	20,9
2018	5487	14,3	844	18,6

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2010

b Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7
2016	543	1,4	111	2,4
2017	490	1,3	87	1,9

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2
2017	952	715	237	20,9	32,6	10,1
2018	844	625	219	18,6	28,6	9,3

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269/ ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587/ ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616/ ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/
2017	15,1	22,2	8,4
	/5787/	/4126/	/1661/
2018	14,3	21,0	8,0
	/5487/	/3900/	/1587/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGIChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	220
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
2017	952	15	8	290	444	195
2018	844	6	9	241	404	184
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
2017	20,9	2,3	3,9	17,8	35,1	24,3
2018	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2001	10672	10183	489	27,6	26,4	1,3
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
2017	5787	5531	256	15,1	14,4	0,7
2018	5487	5244	243	14,3	13,7	0,6
Śląskie						
2001	1456	1411	45	30,1	29,2	0,9
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2
2017	952	916	36	20,9	20,1	0,8
2018	844	814	30	18,6	17,9	0,7

^a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
			gruźlica płuc i pozapłucna	w tym	
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna		gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2002	2934	2732	1479	1321	690
2003	2692	2476	1283	1164	637
2004	2849	2611	1320	1220	632
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
2017	.	.	952	916	624
2018	.	.	844	814	530
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2002	62,0	57,7	31,2	27,9	14,6
2003	57,1	52,5	27,2	24,6	13,5
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6
2017	.	.	20,9	20,1	13,7
2018	.	.	18,6	17,9	11,7

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania MZ - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	526	1,4	101	2,2
2017	5531	14,4	916	20,1	468	1,2	81	1,8
2018	5244	13,7	814	17,9	.	.	.	.

a Łącznie z PKP, MON i MSW

b Bez PKP, MON i MSW

Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2017 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25
2016	543	1,4	0,14	111	2,4	0,23
2017	490	1,3	0,12	87	1,9	0,17

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie udało się ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26
2016	349	1,5	0,15	94	2,7	0,24
2017	304	1,3	0,12	78	2,2	0,19

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19
2016	194	1,3	0,13	17	1,6	0,16
2017	186	1,2	0,12	9	0,9	0,08

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37
2016	418	2,2	0,21	75	3,4	0,29
2017	383	2,1	0,18	72	3,3	0,27

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06
2016	125	0,6	0,07	36	1,5	0,15
2017	107	0,5	0,05	15	0,6	0,06

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2017	490	-	-	-	4	27	73	119	267
Mężczyźni	383	-	-	-	2	23	63	109	186
Kobiety	107	-	-	-	2	4	10	10	81
Miasta	304	-	-	-	3	19	54	75	153
Wieś	186	-	-	-	1	8	19	44	114
Śląskie ogółem 2017	87	-	-	-	1	7	8	25	46
Mężczyźni	72	-	-	-	-	6	7	20	39
Kobiety	15	-	-	-	1	1	1	5	7
Miasta	78	-	-	-	1	6	7	23	41
Wieś	9	-	-	-	-	1	1	2	5
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2017	1,3	-	-	-	0,1	0,4	1,4	2,4	2,9
Mężczyźni	2,1	-	-	-	0,1	0,7	2,4	4,4	4,9
Kobiety	0,5	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,4	1,5
Miasta	1,3	-	-	-	0,1	0,5	1,7	2,5	2,6
Wieś	1,2	-	-	-	0,0	0,3	0,9	2,2	3,6
Śląskie ogółem 2017	1,9	-	-	-	0,2	0,9	1,3	4,0	4,0
Mężczyźni	3,3	-	-	-	-	1,6	2,2	6,5	8,1
Kobiety	0,6	-	-	-	0,4	0,3	0,3	1,5	1,1
Miasta	2,2	-	-	-	0,2	1,0	1,5	4,7	4,5
Wieś	0,9	-	-	-	-	0,6	0,7	1,4	2,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6
2016	526	1,4	101	2,2
2017	468	1,2	81	1,8

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

a Od 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2006	33	1316	1295	25247	344993	262,2	71,8	13,7	19,2
2007	33	1274	1273	26387	336858	264,4	72,4	12,8	20,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
2017	26	1114	1132	28856	244688	219,6	60,2	8,5	25,9
2018	28	1118	1114	29486	231574	207,1	56,7	7,9	26,4
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	9	414	414	6396	94523	228,3	62,6	14,8	15,4
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	2801	13881	81,2	22,2	5,0	16,4
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	18	533	529	20289	123170	231,1	63,3	6,1	38,1

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, OAiSM - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Śląskie ^a	901	789	867	765	34	24	19,8	17,4	19,0	16,8	0,7	0,5
Powiaty												
będziński	61	37	57	36	4	1	40,8	24,8	38,1	24,2	2,7	0,7
bielski	54	28	52	26	2	2	33,1	17,0	31,8	15,8	1,2	1,2
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cieszyński	32	14	32	13	-	1	18,0	7,9	18,0	7,3	-	0,6
częstochowski	-	1	-	1	-	-	-	0,7	0,0	0,7	-	-
gliwicki	112	62	110	61	2	1	97,0	53,7	95,2	52,8	1,7	0,9
kłobucki	1	1	1	1	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-
lubliniecki	47	34	45	33	2	1	61,2	44,3	58,6	43,0	2,6	1,3
mikołowski	111	75	110	74	1	1	114,1	76,5	113,0	75,5	1,0	1,0
myszkowski	7	1	7	1	-	-	9,8	1,4	9,8	1,4	-	-
pszczyński	8	9	8	9	-	-	7,2	8,1	7,2	8,1	-	-
raciborski	18	19	18	19	-	-	16,5	17,5	16,5	17,5	-	-
rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	15	17	14	15	1	2	10,8	12,2	10,1	10,8	0,7	1,4
wodzisławski	70	62	70	62	-	-	44,3	39,4	44,3	39,4	-	-
zawierciański	8	12	5	12	3	-	6,7	10,1	4,2	10,1	2,5	-
żywiecki	2	13	2	12	-	1	1,3	8,5	1,3	7,8	-	0,7
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	3	-	3	-	-	-	1,7	-	1,7	-	-	-
Bytom	35	36	32	35	3	1	20,7	21,5	18,9	20,9	1,8	0,6
Chorzów	97	65	94	61	3	4	88,9	59,8	86,1	56,1	2,7	3,7
Częstochowa	97	100	91	99	6	1	43,1	44,8	40,4	44,3	2,7	0,4
Dąbrowa Górnicza	5	21	4	20	1	1	4,1	17,4	3,3	16,6	0,8	0,8
Gliwice	24	19	22	19	2	-	13,2	10,5	12,1	10,5	1,1	-
Jastrzębie Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaworzno	-	2	-	2	-	-	-	2,2	-	2,2	-	-
Katowice	26	43	25	41	1	2	8,7	14,6	8,4	13,9	0,3	0,7
Mysłowice	-	11	-	11	-	-	-	14,7	-	14,7	-	-
Piekary Śląskie	1	2	1	2	-	-	1,8	3,6	1,8	3,6	-	-
Ruda Śląska	7	23	7	21	-	2	5,0	16,6	5,0	15,2	-	1,4
Rybnik	4	7	4	6	-	1	2,9	5,0	2,9	4,3	-	0,7
Siemianowice Śląskie	1	5	1	5	-	-	1,5	7,4	1,5	7,4	-	-
Sosnowiec	27	39	26	37	1	2	13,2	19,2	12,7	18,2	0,5	1,0
Świętochłowice	4	4	4	4	-	-	7,9	8,0	7,9	8,0	-	-
Tychy	-	7	-	7	-	-	-	5,5	-	5,5	-	-
Zabrze	23	20	21	20	2	-	13,1	11,5	12,0	11,5	1,1	-
Żory	1	-	1	-	-	-	1,6	-	1,6	-	-	-

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w poradniach zlokalizowanych poza woj. śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017 - 2018
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Śląskie	923	895	20,3	19,7	680	674	31,0	30,8	243	221	10,3	9,4
Powiaty												
będziński	17	22	11,4	14,2	11	16	15,5	22,6	6	6	7,7	7,7
bielski	11	16	6,7	9,7	6	10	7,5	12,4	5	6	5,9	7,1
bieruńsko-lędzki	14	12	23,5	20,1	7	11	23,9	37,3	7	1	23,2	3,3
cieszyński	22	27	12,3	15,2	16	23	18,5	26,6	6	4	6,5	4,4
częstochowski	27	34	20,0	25,2	20	28	30,2	42,4	7	6	10,1	8,7
gliwicki	32	34	27,7	29,4	25	27	44,6	48,2	7	7	11,7	11,8
kłobucki	9	10	10,6	11,8	7	5	16,7	11,9	2	5	4,6	11,6
lubliniecki	19	24	24,7	31,3	18	18	47,7	47,8	1	6	2,6	15,4
mikołowski	23	18	23,5	18,3	19	15	40,0	31,4	4	3	8,0	5,9
myszkowski	13	7	18,2	9,8	8	5	23,2	14,6	5	2	13,6	5,4
pszczyński	17	23	15,4	20,7	14	19	25,9	35,0	3	4	5,3	7,0
raciborski	17	15	15,6	13,8	13	12	24,8	23,0	4	3	7,1	5,3
rybnicki	5	10	6,4	12,8	3	8	7,8	20,8	2	2	5,1	5,0
tarnogórski	28	17	20,1	12,2	24	12	35,4	17,7	4	5	5,6	7,0
wodzisławski	30	34	19,0	22,6	26	32	33,9	41,7	4	2	4,9	2,5
zawierciański	12	15	10,1	12,7	10	14	17,4	24,4	2	1	3,3	1,6
żywiecki	18	27	11,8	17,6	16	23	21,4	30,7	2	4	2,6	5,1
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	25	29	14,6	16,9	16	22	19,7	27,2	9	7	10,0	7,7
Bytom	70	57	41,6	34,2	48	38	59,7	47,7	22	19	25,0	21,8
Chorzów	20	31	18,3	28,6	16	20	30,9	38,8	4	11	7,0	19,3
Częstochowa	50	66	22,3	29,7	36	46	34,2	44,1	14	20	11,8	17,0
Dąbrowa Górnicza	23	16	19,0	13,3	14	12	24,1	20,9	9	4	14,3	6,4
Gliwice	56	44	30,9	24,5	35	33	40,0	38,2	21	11	22,4	11,8
Jastrzębie Zdrój	20	10	22,3	11,2	14	9	32,0	20,7	6	1	13,1	2,2
Jaworzno	17	3	18,5	3,3	13	0	29,1	00,0	4	3	8,4	6,4
Katowice	53	48	17,9	16,3	41	37	29,1	26,4	12	11	7,7	7,1
Mysłowice	15	15	20,1	20,1	11	14	30,5	38,8	4	1	10,4	2,6
Piekary Śląskie	25	25	44,9	45,2	16	18	60,0	67,9	9	7	31,1	24,3
Ruda Śląska	40	37	28,9	26,8	33	27	49,3	40,5	7	10	9,8	14,0
Rybnik	26	23	18,7	16,6	17	14	25,0	20,7	9	9	12,6	12,7
Siemianowice Śl.	22	13	32,6	19,4	17	11	52,8	34,4	5	2	14,2	5,7
Sosnowiec	35	41	17,2	20,3	28	27	29,0	28,2	7	14	6,5	13,2
Świętochłowice	14	8	27,8	16,0	10	5	41,3	20,8	4	3	15,3	11,5
Tychy	20	20	15,6	15,6	16	15	25,9	24,4	4	5	6,0	7,5
Zabrze	67	62	38,4	35,8	51	46	60,7	55,0	16	16	17,7	17,8
Żory	11	2	17,7	3,2	5	2	16,4	6,6	6	-	18,9	-

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl. UW

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Polska	6444	5787	5487	16,8	15,1	14,3
1. Dolnośląskie	435	427	377	15,0	14,7	13,0
2. Kujawsko - pomorskie	279	239	211	13,4	11,5	10,1
3. Lubelskie	444	466	497	20,8	21,9	23,4
4. Lubuskie	130	131	119	12,8	12,9	11,7
5. Łódzkie	518	456	406	20,8	18,4	16,4
6. Małopolskie	497	458	440	14,7	13,5	13,0
7. Mazowieckie	1304	1038	954	24,3	19,3	17,7
8. Opolskie	154	133	127	15,5	13,4	12,9
9. Podkarpackie	326	257	263	15,3	12,1	12,4
10. Podlaskie	121	131	86	10,2	11,1	7,3
11. Pomorskie	332	265	349	14,4	11,4	15,0
12. Śląskie	972	952	844	21,3	20,9	18,6
13. Świętokrzyskie	289	206	209	23,0	16,5	16,8
14. Warmińsko-mazurskie	152	132	124	10,6	9,2	8,7
15. Wielkopolskie	281	311	279	8,1	8,9	8,0
16. Zachodniopomorskie	210	185	202	12,3	10,8	11,9

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2018 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2018	5487	52	60	1473	2494	1408	14,3	0,9	3,3	10,5	24,7	21,3
1. Dolnośląskie	377	2	2	112	181	80	13,0	0,5	1,6	10,5	23,5	15,3
2. Kujawsko - pomorskie	211	1	6	80	75	49	10,1	0,3	5,8	10,6	13,5	14,0
3. Lubelskie	497	3	7	118	200	169	23,4	1,0	6,5	15,3	35,9	45,0
4. Lubuskie	119	1	-	26	55	37	11,7	0,6	-	7,0	20,4	22,0
5. Łódzkie	406	2	3	96	190	115	16,4	0,6	2,7	11,1	28,5	24,3
6. Małopolskie	440	5	6	92	176	161	13,0	0,9	3,4	7,3	20,5	29,0
7. Mazowieckie	954	18	7	272	434	223	17,7	2,1	2,8	13,8	32,0	23,8
8. Opolskie	127	-	1	29	59	38	12,9	-	2,2	8,2	21,1	21,5
9. Podkarpackie	263	5	5	53	119	81	12,4	1,6	4,4	6,6	21,6	23,6
10. Podlaskie	86	2	-	26	34	24	7,3	1,2	-	6,0	10,6	11,9
11. Pomorskie	349	1	3	110	176	59	15,0	0,3	2,6	12,8	29,8	15,7
12. Śląskie	844	6	9	241	404	184	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2
13. Świętokrzyskie	209	-	2	47	100	60	16,8	-	3,3	10,6	29,8	25,8
14. Warmińsko-mazurskie	124	1	2	26	63	32	8,7	0,5	2,7	4,9	16,3	14,4
15. Wielkopolskie	279	4	6	83	135	51	8,0	0,7	3,5	6,4	15,2	9,1
16. Zachodniopomorskie	202	1	1	62	93	45	11,9	0,4	1,2	10,0	20,1	15,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Polska	6116	5531	5244	15,9	14,4	13,7
1. Dolnośląskie	409	415	366	14,1	14,3	12,6
2. Kujawsko - pomorskie	263	219	197	12,6	10,5	9,5
3. Lubelskie	417	446	474	19,5	20,9	22,3
4. Lubuskie	123	123	114	12,1	12,1	11,2
5. Łódzkie	490	436	392	19,7	17,6	15,9
6. Małopolskie	477	440	409	14,1	13,0	12,0
7. Mazowieckie	1232	986	906	23,0	18,4	16,8
8. Opolskie	147	127	120	14,8	12,8	12,1
9. Podkarpackie	305	244	244	14,3	11,5	11,5
10. Podlaskie	116	125	84	9,8	10,5	7,1
11. Pomorskie	320	256	332	13,8	11,0	14,3
12. Śląskie	918	916	814	20,1	20,1	17,9
13. Świętokrzyskie	279	196	205	22,2	15,7	16,5
14. Warmińsko-mazurskie	147	124	121	10,2	8,6	8,5
15. Wielkopolskie	271	298	269	7,8	8,6	7,7
16. Zachodniopomorskie	202	180	197	11,8	10,5	11,6

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2018 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2018	5244	35	58	1418	2410	1323	13,7	0,6	3,1	10,1	23,9	20,0
1. Dolnośląskie	366	2	2	109	175	78	12,6	0,5	1,6	10,2	22,7	14,9
2. Kujawsko - pomorskie	197	1	5	74	72	45	9,5	0,3	4,8	9,8	13,0	12,9
3. Lubelskie	474	1	7	113	194	159	22,3	0,3	6,5	14,7	34,8	42,4
4. Lubuskie	114	1	-	26	51	36	11,2	0,6	-	7,0	18,9	21,4
5. Łódzkie	392	2	3	92	185	110	15,9	0,6	2,7	10,6	27,8	23,2
6. Małopolskie	409	3	5	88	169	144	12,0	0,6	2,9	7,0	19,7	25,9
7. Mazowieckie	906	15	7	257	418	209	16,8	1,7	2,8	13,0	30,8	22,3
8. Opolskie	120	-	1	26	56	37	12,1	-	2,2	7,3	20,0	20,9
9. Podkarpackie	244	3	5	52	110	74	11,5	0,9	4,4	6,5	19,9	21,5
10. Podlaskie	84	2	-	25	33	24	7,1	1,2	-	5,8	10,3	11,9
11. Pomorskie	332	-	3	107	169	53	14,3	-	2,6	12,5	28,6	14,1
12. Śląskie	814	2	9	235	392	176	17,9	0,3	4,5	14,6	31,4	21,2
13. Świętokrzyskie	205	-	2	46	100	57	16,5	-	3,3	10,4	29,8	24,5
14. Warmińsko-mazurskie	121	1	2	26	63	29	8,5	0,5	2,7	4,9	16,3	13,0
15. Wielkopolskie	269	1	6	82	130	50	7,7	0,2	3,5	6,3	14,6	9,0
16. Zachodniopomorskie	197	1	1	60	93	42	11,6	0,4	1,2	9,7	20,1	14,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Polska	537	543	490	1,4	1,4	1,3
1. Dolnośląskie	42	40	49	1,4	1,4	1,7
2. Kujawsko - pomorskie	11	13	20	0,5	0,6	1,0
3. Lubelskie	34	25	32	1,6	1,2	1,5
4. Lubuskie	11	14	14	1,1	1,4	1,4
5. Łódzkie	41	49	28	1,6	2,0	1,1
6. Małopolskie	43	39	35	1,3	1,2	1,0
7. Mazowieckie	82	93	71	1,5	1,7	1,3
8. Opolskie	8	4	9	0,8	0,4	0,9
9. Podkarpackie	13	17	20	0,6	0,8	0,9
10. Podlaskie	13	15	23	1,1	1,3	1,9
11. Pomorskie	28	34	22	1,2	1,5	0,9
12. Śląskie	124	111	87	2,7	2,4	1,9
13. Świętokrzyskie	20	24	18	1,6	1,9	1,4
14. Warmińsko-mazurskie	24	20	15	1,7	1,4	1,0
15. Wielkopolskie	19	18	26	0,5	0,5	0,7
16. Zachodniopomorskie	24	27	21	1,4	1,6	1,2

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2003	93,5	93,7
2004	94,1	93,7
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4
2017	91,8	92,0
2018	91,7	91,1

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz obliczenia własne.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)		
	2016	2017	2018
Polska	92,6	91,8	91,7
1. Dolnośląskie	95,3	94,0	90,8
2. Kujawsko - pomorskie	93,2	93,3	93,6
3. Lubelskie	90,3	89,3	89,1
4. Lubuskie	92,0	91,7	90,8
5. Łódzkie	91,8	90,9	91,6
6. Małopolskie	92,4	90,7	91,1
7. Mazowieckie	93,4	92,8	91,8
8. Opolskie	90,3	89,6	90,7
9. Podkarpackie	91,5	91,4	90,4
10. Podlaskie	91,6	89,9	90,9
11. Pomorskie	93,5	92,5	99,7
12. Śląskie	92,4	92,0	91,1
13. Świętokrzyskie	91,1	91,0	89,5
14. Warmińsko-mazurskie	93,1	91,8	92,0
15. Wielkopolskie	92,6	91,7	90,4
16. Zachodniopomorskie	92,7	91,2	90,3

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2016, 2017, 2018 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2015		2016		2017	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	583	6,8	634	7,3	570	6,5
2	Belgium	1313	12,8	977	8,7	1042	9,2	972	8,6
3	Bulgaria	.	.	1660	23,0	1603	22,4	1463	20,6
4	Croatia	.	.	488	11,5	464	11,1	371	8,9
5	Cyprus	33	4,2	63	7,4	60	7,1	53	6,2
6	Czech Republic	1442	14,0	517	4,9	516	4,9	505	4,8
7	Denmark	548	10,3	357	6,3	330	5,8	275	4,8
8	Estonia	791	57,9	217	16,5	193	14,7	175	13,3
9	Finland	537	10,4	270	4,9	233	4,2	237	4,3
10	France	6714	11,0	4744	7,1	4907	7,4	5131	7,7
11	Germany	9064	11,0	5834	7,2	5949	7,2	5486	6,6
12	Greece	703	6,4	482	4,4	440	4,1	467	4,3
13	Hungary	3598	35,9	906	9,2	786	8,0	685	7,0
14	Iceland	.	.	7	2,1	6	1,8	14	4,1
15	Ireland	403	10,6	283	6,1	315	6,7	318	6,6
16	Italy	4759	8,3	3769	6,2	4032	6,6	3944	6,5
17	Latvia	2063	87,0	721	36,3	660	33,5	552	28,3
18	Lithuania	2981	85,2	1507	51,6	1442	49,9	1387	48,7
19	Luxembourg	44	10,1	30	5,3	29	5,0	32	5,4
20	Malta	18	4,6	32	7,3	50	11,1	42	9,1
21	Netherlands	1404	8,8	862	5,1	887	5,2	787	4,6
22	Norway	.	.	313	6,1	295	5,7	261	5,0
23	Poland	11477	29,7	6430	16,9	6444	17,0	5787	15,2
24	Portugal	4494	44,9	2196	21,2	1936	18,7	1800	17,5
25	Romania	.	.	15183	76,4	13601	68,8	13004	66,2
26	Slovakia	1111	20,6	317	5,8	296	5,5	249	4,6
27	Slovenia	380	19,1	130	6,3	118	5,7	112	5,4
28	Spain	8395	20,6	5021	10,8	5063	10,9	4570	9,8
29	Sweden	458	5,2	815	8,4	714	7,2	520	5,2
30	United Kingdom	6792	11,5	6224	9,6	6116	9,4	5567	8,5
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	60938	11,9	59162	11,5	55336	10,7

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2015-2017: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2019, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2019.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2017 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	13	2,3	8	1,4	108	19,2	193	34,3	128	22,8	112	19,9	-	-	562
2	Belgium	32	3,5	36	3,9	163	17,8	363	39,6	217	23,7	105	11,5	-	-	916
3	Bulgaria	35	2,5	70	5,0	93	6,6	395	28,1	521	37,0	294	20,9	-	-	1408
4	Croatia	-	-	3	0,8	21	5,8	62	17,0	139	38,2	139	38,2	-	-	364
5	Cyprus	1	1,9	2	3,8	14	26,9	22	42,3	10	19,2	3	5,8	-	-	52
6	Czech Republic	5	1,0	1	0,2	29	5,8	159	31,9	194	38,9	111	22,2	-	-	499
7	Denmark	4	1,6	8	3,2	28	11,1	93	36,8	93	36,8	27	10,7	-	-	253
8	Estonia	-	-	-	-	5	2,9	45	26,3	80	46,8	41	24,0	-	-	171
9	Finland	3	1,3	3	1,3	35	15,0	52	22,2	39	16,7	102	43,6	-	-	234
10	France	205	4,2	189	3,9	743	15,4	1819	37,6	1005	20,8	876	18,1	2	0,0	4839
11	Germany	131	2,4	106	2,0	1392	26,0	1733	32,4	1025	19,1	956	17,9	10	0,2	5353
12	Greece	3	0,7	8	1,8	46	10,6	111	25,6	125	28,8	137	31,6	4	0,9	434
13	Hungary	3	0,5	3	0,5	35	5,4	134	20,6	313	48,2	162	24,9	-	-	650
14	Iceland	-	-	-	-	2	15,4	5	38,5	4	30,8	2	15,4	-	-	13
15	Ireland	5	1,7	4	1,3	35	11,6	118	39,2	74	24,6	63	20,9	2	0,7	301
16	Italy	84	2,2	83	2,2	888	23,2	1437	37,5	752	19,6	584	15,3	-	-	3828


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2017 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	7	1,3	3	0,6	39	7,2	202	37,2	220	40,5	72	13,3	-	-	543
18	Lithuania	11	0,9	33	2,6	86	6,8	421	33,2	521	41,1	196	15,5	-	-	1268
10	Luxembourg	-	-	1	3,1	3	9,4	14	43,8	10	31,3	4	12,5	-	-	32
20	Malta	-	-	-	-	8	19,0	29	69,0	4	9,5	1	2,4	-	-	42
21	Netherlands	13	1,7	21	2,7	135	17,4	337	43,4	173	22,3	97	12,5	-	-	776
22	Norway	6	2,5	13	5,5	60	25,3	101	42,6	41	17,3	16	6,8	-	-	237
23	Poland	22	0,4	46	0,8	213	3,8	1386	25,0	2464	44,5	1404	25,4	-	-	5535
24	Portugal	25	1,4	18	1,0	169	9,6	508	28,9	586	33,3	454	25,8	-	-	1760
25	Romania	199	1,6	332	2,7	1398	11,4	3944	32,0	4482	36,4	1955	15,9	-	-	12310
26	Slovakia	29	12,7	16	7,0	18	7,9	39	17,1	69	30,3	57	25,0	-	-	228
27	Slovenia	2	1,8	-	-	2	1,8	16	14,3	38	33,9	54	48,2	-	-	112
28	Spain	130	3,0	144	3,3	377	8,6	1511	34,5	1243	28,4	974	22,2	-	-	4379
29	Sweden	7	1,4	19	3,9	118	24,2	201	41,2	81	16,6	62	12,7	-	-	488
30	United Kingdom	79	1,5	116	2,2	662	12,6	2237	42,6	1325	25,2	829	15,8	-	-	5248
Subtotal EU/EAA		1054	2,0	1286	2,4	6925	13,1	17687	33,5	15976	30,2	9889	18,7	18	0,0	52835


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2019", European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2019

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM -
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2018 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2017 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



**SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHOROŢ PŁUC (4270-4273)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

